anevrisme de l'aorte à la suite d'une playe d'arme à feu.

Un Bourgeois de Belfort, agé de 52. Années d'un fort temperament, trés prompt, et colerique de Cinq pieds et demy de grandeur, qui dans Sa Jeunesse avoit mené Une Vie trés laborieuse, et frugale, Etoit continuellement exposé a faire des Efforts considerables, de meme qu'a des Violentes Courses tant a pied qu'a cheval; qu'il moderoit a mesure que Ses affaires en devenoient meilleures.

Si d'un cotté il exerceoit moins Son Corps, par contre de l'autre il Se livroit quelques fois aux plaisirs, et le nourissoit d'Alimens plus Succulens.

Il y a Environ 15. ans, que Voyageant (: et aprés avoir Copieusement diné :) Il poussa pendant une lieue Son Cheval a toute bride Surtout dans une descente, Sur laquelle Se trouva Un Enfant, que Son Cheval alloit Ecraser, ce qui obligea le Cavalier a l'arrêter tout a coup de force, le Cheval S'abatit, et Jetta Son Cavalier parterre, qui tomba malheureusement Sur la Crosse d'un de Ses pistolets, qui l'avoit précedé: le Coup porta directement dans la partie Superieure des os du Sternum, et principalement Sur l'articulation de la Clavicule droite avec ces memes os, dans laquelle partie ce Monsieur Sentit d'abord une Vive douleur, Sans qu'il parut Exterieurement ny contusion ny Echimose.

La Douleur devenant Supportable ce Bourgeois deux heures aprés Se remit a table, ou il fit aussy bien Son devoir comme Si Rien ne luy fut arrivé, et de plus il dansa plusieurs allemandes, qui n'Exigent pas moins de legereté, que de force; car pour y briller Il faut Souvent Elever de terre Sa danseuse et la porter aussi haut, que les bras du danseur peuvent S'Etendre, Cette douleur Etant legere

ARC54 n°57

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Et ne se faisant sentir que de tems à autre on y a Jamais fait attention.

Il y a cinq a six ans, que ce bourgeois fût forcé de faire une violente course de six lieues partie acheval partie a pied pendant laquelle il y eût autant de terreur, que de vitesse.

Cette course ne rendit pas seulement la legere douleur plus frequente, mais elle en occasionna une seconde dans la partie superieure du Dos et une legere Extinction de voix de façon neanmoins, que lors que la douleur anterieure ne se faisoit pas sentir, la posterieure etoit en vigueur, mais non pas continuellement, il y avoit des Intervalles considerables, ou le malade ne resentoit ny l'un ny l'autre.

Il y a deux années, que ce Monsieur revenant de campagne crût qu'un coup de soleil luy avoit occasionné un Erésipele, qui effectivement en etoit un sur toutte l'Etendue du muscle trapéze, qui continuant du côté gauche occupoit le col, a toute la partie, que couvre le grand pectoral du même côté.

La fievre Etoit legere avec un grand tiraillement, une tension considerable dans toutes ces parties, une pulsation, que le malade sentoit sous l'omoplate gauche, et presque une totale extinction de voix.

Trois a quatre saignées tant du bras, que du pied /: d'un sang si coineux qu'a peine pouvoit on appercevoir au fond des palettes une huitieme partie de Rouge, et quoy qu'on le laissa Jusqu'a vingt quatre heures exposé a l'air, il n'y avoit pas la moindre serosité :/ firent cesser la fievre et disparoitre l'Erésipele; mais la tension, les tiraillements, la pulsation, et l'Extinction de voix

Subsisterent, le Ventre devint paresseux le pouls droit, lent — cependant regulier, celuy du bras gauche de plus en plus petit, au point, que dans un mois il fut entierement Eclipsé, et ne s'est fait ressentir, que deux a trois mois avant la mort, les — Insomnies commencerent, et ont continuées Jusqu'au décès du malade.

Tandis que l'on employoit Exterieurement les fomentations, les Cataplasmes Emolliens, et les anodins, l'on continuoit les saignées /: qui donnoient toujour le même Sang :/ l'on n'Epargnoit pas Interieurement les remedes délayans, et attenuans Entremêlés de legers purgatifs, mais tout fut Inutile ..

L'on crû, que les Eaux thermales de Plombiere Bues, les bains, et la douche de ces memes Eaux produiroient un meilleur Effet, que les remedes que l'on avoit Jusqu'alors pratiqués; mais l'on fut bien trompé dans Son attente, puisque le malade en revint les derniers Jours du mois de Septembre de l'année 1751. presque dans le meme Etat quil y Etoit allé, avec cette difference, que s'il ne restoit plus de tension, que dans la partie du grand pectoral gauche qui couvre les Cotes, et principalement sur celle qui est sur le Sternum, la pulsation etoit devenu plus Violente, et les — tiraillements plus fortes.

Ce peû de Succes des Eaux determina a Reiterer les Saignées — /: dont le Sang, qui en Sortoit n'avoit pas changé :/, les delayans, et les attenuans; de même que les Cataplasmes. dans la quinzaine la tension fut entierement dissipée, mais quelle Surprise de sentir et voir a sa place une pulsation, tantôt plus, tantôt moins — Violente, entre les Cartilages de la 2.e et de la 3.e des Côtes Gauches,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

dont une partie de Cette même pulsation Sembloit Sortir de dessous le Sternum.

Cette pulsation ne laissa aucun doutte quelle ne fût l'Effet d'un Vray anevrisme, que l'on cru estre dans la partie Superieure de la Crosse de la orte; ce fût pour lors qu'on s'attacha de plus en plus a Rendre le Sang plus fluide, a le tenir par les Saignées dans une Juste proportion, l'on continua les delayans, et les attenuans, l'on mit en Usage les Eaux aigretettes des Basse Salter, et Celles des Suran tantôt Coupées avec le lait tantot Seules

On Etoit Souvent obligé à cause des grandes Insomnies de Courir aux Narcotiques, mais pendant plus de huit mois, le plus Efficace etoit la Saignée pendant lequel tems, il arriva plusieurs engorgemens dans les poumons et Surtout dans le gauche; pour lors le poulx etoit très prompt et petit; et amesure qu'on faisoit des Saignées, il reprenoit Son premier Etat.

Jamais il n'y a eu ny palpitation, ny Intermittence dans le poulx ny Sincopes, il y a eu Seulement dans les quatre derniers mois plusieurs accès de fievre, qui commençoient toujour par un frisson.

Tous les Jours la pulsation Sembloit S'Eloigner du Sternum, devenir plus considerable, et Se porter vers la partie moyenne et anterieure du Côté gauche, depuis la partie Inferieure de la 2e. Côte Jusqu'à la même partie de la 4e. ou il Se forma Une thumeur, qui a été poussée Jusqu'à 14. pouces de Circonference, Sur deux et trois d'Elevation, laquelle pulsation Se faisoit Sentir, et voir tantôt plus tantôt moins Violente. quelques fois cette thumeur Sembloit rentrer,

pour lors le malade Sentoit des douleurs plus aigues Sur les Vertebres du dos; mais dé quelle reparoissoit, les douleurs Etoient plus Supportable et la Voix Se retablissoit un peut.

Dé ce tems les Saignées ne Servirent plus de narcotique, et le sang avoit totalement changé, Sa partie rouge etoit encore diminuée, et la limphatique nétoit plus coineuse, et ne se figeoit plus pas meme au Sortir du Vaisseau, cependant il falloit Souvent revenir aux Saignées parce quil arrivoit des plus frequentes engorgemens dans le poumon droit, le gauche Se fletrissant, comme il Sest verifié par louverture du Cadavre.

Pendant la durée de la maladie, lon a tenu le malade a Une nouriture tres legere, et de facile digestion, et dé quon Sest apperçu de la dissolution du Sang, on luy a fait User des Remedes propres a en raprocher les parties.

Le Malade a toujour eu grand appetit, que les plus vives douleurs ne Ralentissoit pas. de paresseux quetoit le Ventre, il ne Vint que trop libre quinze Jours avant la mort du malade, qui arriva le 17. fevrier de lannée courante par la Ruption Interieure du Sac anevriomal Immediatement Sous la 3.e Cote et a l'Extremité de sa Carie Comme on le Verra.

On Croit quil Suffit de dire les adherences de la masse quon presente a Messieurs de l'academie.

La premiere Etoit en Sa partie droite Superieure, ou elle se trouve dechirée en la Separant de l'Extremité de la Clavicule droite, elle l'Etoit dans toutte Son Etendue au mediastin, a la trachée, et a la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

plevre Superieurement, a l'Exeption dela partie que le poumont gauche couvroit, il etoit fletri, et n'avoit plus que trois pouces de longueur, sur deux de largeur, et dans son millieu, il conservoit trois lignes d'Epaiseur, sa couleur et sa figure s'etoient soutenueis.

Cette masse Etoit encore adherente a la partie Superieure, et laterale du pericarde, qui contenoit plus de dix onces de serosité la 4. et 5.e Vertebres du dos Etoient caries dela largeur de trois lignes, la premiere dans sa partie Inferieure laterale, la seconde dans la meme partie laterale, moins superieure, il restoit quelques parcelles d'os au cartilage dela troisieme Côte. entre les divisions dela trachée au poumon droit, Il y avoit plusieurs concretions pierreuses, le coeur Etoit entierement Vuide aussy bien, que les Vaisseaux, et le premier ne contenoit ny polype ny concretion polypeuse, L'Ichorie etoit abondante entre les membranes de l'aorte, et les concretions polypeuses. Il y avoit autour de deux pots de sang épanché dans la capacité dela poitrine, dont environ quatre onces etoit caillé, le sac anevrismal, contenoit encore bien une chopine de sang fluide (: tout ce sang n'etoit proprement qu'une eau teinte :), Un Infilteration dans toutes les parties exterieures dela poitrine, et la partie Superieure de l'anevrisme etoit presque revetue Interieurement de lames osseuses, Il en reste quelques unes, les autres onts esteés Enlevées par les assistans.

La partie Suppérieure dela orte descendente est cartilagineuse en forme de bourlet du Côté gauche dela crosse, on trouvera trois arteres dont les deux du millieu, faisoitent le meme trajets, que fait

la Carotide, et le troisieme Suivoit Sa Routte ordinaire; mais le peu de tems que l'on a donné pour l'ouverture du Cadavre, n'a pas permis d'examiner Si C'estoit la Carotide Interne, et la Carotide Externe.

Dans le Cours de la maladie, il y eût plusieurs medecins et chirurgiens d'appellés en Consultation; les premiers nierent l'anevrisme, et dirent, que la pulsation que l'on Sentoit et que l'on voioit n'étoit qu'une continuité du tremoussement que le Coeur Souffroit, Etant obligé de S'Elever plus haut; et donnoient pour Cause un polype, ou quelque Concretion polypeuse, dont une partie avoit passée Jusqu'à L'orifice de la Sousclaviere gauche, et qui en diminuant Son diametre, avoit fait disparoitre le pouls du meme Coté.

Les derniers opinerent pour l'Anevrisme.

L'ouverture du Cadavre ayant fait Voir qu'il y avoit réellement anevrisme, les partisans du Contraire Se sont, malgré ce qu'ils la Voyoient plus opiniatre dans leur Sentimens en disans que S'il n'y avoit pas Eu des Concretions polypeuses Jamais il n'y auroit Eu D'anevrisme.

Messieurs de l'academie Sont trés Instamment Suppliés de decider Si les Concretions polypeuses Sont L'Effet de l'anevrisme par Contre Si l'anevrisme est L'Effet des Concretions polypeuses, et Si dans tous les anevrisme Inveterés Il n'y a pas toujours des Concretions polypeuses.

De Belfort Le 24 fevrier 1753

Carlhan Docteur en medecine
Ventrillon
Chirurgien juré

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 55